

Hemopropin®

UpLab
PHARMACEUTICALS

αλοιφή



Άμεσο
αποτέλεσμα

Για την πρόληψη και ανακούφιση
από τα συμπτώματα των αιμορροϊδών

✚ Κλινικά αποδεδειγμένη δράση

- Ανακουφίζει από τα δυσάρεστα συμπτώματα των αιμορροϊδών
- Μειώνει τον ερεθισμό στο βλεννογόνο του ορθού
- Συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση του κατεστραμμένου βλεννογόνου
- Μειώνει τη φλεγμονή και το οίδημα του ορθού και των υποβλεννογόνιων οζιδίων
- Χωρίς αντενδείξεις, παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες
- Χωρίς περιορισμό στη χρήση

Κατάλληλο για εγκύους
& θηλάζουσες μητέρες

20 g

Ιατροτεχνολογικό προϊόν CLASS IIa



Η αλοιφή Hemopropin® περιέχει βάμματα πρόπολης και χαμομηλιού σε ελαιώδη βάση (βαζελίνη και λανολίνη), η οποία δημιουργεί προστατευτικό φίλμ στην περιοχή του ορθού.

Δράση Hemopropin®:

ΣΤΥΠΤΙΚΗ	ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΩΘΗΤΙΚΗ	ΑΝΤΙ-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ	ΑΝΤΙ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ	ΑΓΓΕΙΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
Καλύπτει αλοιωσίες, συσφίγγει και κλείνει τα μικρά αιμοφόρα αγγέλα, αειφένει την κυκλοφορία του αίματος, επιταχύνει τις έστι τη διαδικασία επούλωσης.	Μειώνει την ευαισθησία των αισθητηριακών νεύρων και απομακρύνει τον πόνο και τον κνησμό, κοινά συμπτώματα της ορθοπρωκτικής νόσου.	Έχει ισχυρή επίδραση στα πρώιμα παθογόνα βακτήρια και αποτέλει τη δευτερογενή λόιμωξη των ορθοπρωκτικών τραυμάτων.	Τα φλαβονοειδή της πρόπολης αναστέλλουν την κυκλοειδυγενάση, που παρεμβαίνει στη σύνθεση των προσταγλανδινών, οι οποίες επιδρούν στη φλεγμονή και τον πόνο.	Η δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης αποτέλει τη δράση διαλυτών & αιδάλων ερεθιστικών από τα κόπρανα στο επιφανειακό στρώμα του πρωκτού.

Κλινική μελέτη για την αποτελεσματικότητα της Hemopropin® στην ανακούφιση & καταστολή των συμπτωμάτων της αιμορροϊδοπάθειας, βαθμού I και II


Σκοπός της κλινικής μελέτης Hemopropin®

1. Να ερευνηθεί η δράση της στην ανακούφιση και την καταστολή των συμπτωμάτων της αιμορροϊδοπάθειας, βαθμού I ή II & στη μείωση της συνολικής κλινικής εικόνας της αιμορροϊδοπάθειας.
2. Να συγκριθεί η δράση της στη θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας I ή II βαθμού, με την δράση ενός φαρμακευτικού προϊόντος για τον ίδιο σκοπό.

Αποτελέσματα

1. Η Hemopropin® αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική στην ανακούφιση των συμπτωμάτων των αιμορροϊδών βαθμού I και II (αιμορραγία, πόνος, κνησμός και πίεση). Περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά τη χρήση της αλοιφής.
2. Η Hemopropin® αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη στην ανακούφιση των συμπτωμάτων των αιμορροϊδών σε σύγκριση με το φαρμακευτικό προϊόν.

Κλινική εικόνα πριν και μετά τη θεραπεία



Γραφική παρουσίαση της συνολικής κλινικής εικόνας της αιμορροϊδοπάθειας πριν και μετά την εφαρμογή της Hemopropin®, πρώι και βράδυ για 2 εβδομάδες. Τα συμπτώματα της αιμορροϊδοπάθειας μειώθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή της Hemopropin® για 2 εβδομάδες.

- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση με τον εσώκλειστο εφαρμογέα
- Δεν περιέχει ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, PARABENS, ΦΑΙΝΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ, PEG, EDTA, SLS ή SLES

Οδηγίες Χρήσης

Κατά τη διάρκεια των έντονων κρίσεων, εφαρμόστε σε καθαρή ορθοπρωκτική περιοχή πρωί και βράδυ. Όταν τα συμπτώματα μειωθούν, εφαρμόστε μόνο το βράδυ.